

For the use only of a Registered Veterinary Practitioner or a Hospital or a Laboratory or a Farm.

## (Sulfaguanidine Antibiotic Oral Powder)

# DIARRSTOP™ Oral Powder

### Anti-diarrheal

#### COMPOSITION:

Each 10 g oral powder contains:  
Sulfaguanidine BP .....9 g  
Excipient s.q.f. ....10 g

#### INDICATIONS:

- Treatment of the infectious enteritis and gastroenteritis caused by germs susceptible to sulfaguanidine.
- Treatment of the coccidiosis of poultry and rabbits.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Oral route, according to the weight:

Adult cattle and equine	30 g to 40 g
Calves and foals	8 g to 10 g
Goats and sheep	4 g to 8 g
Pigs	4 g to 10 g

Administer once or twice a day and reduce the posology from the 3<sup>rd</sup> day. Treat for 4 to 8 days.

#### Poultry and rabbits:

Sulfaguanidine should be administered mixed with dry ration in the proportions of 0.5 to 1%, during 3 to 5 days. The animals should be well watered during the treatment period.

#### TARGET SPECIES:

Cattle, Sheep, Goats, Equines, Dogs, Cats, Poultry and Rabbits.

#### WITHDRAWAL PERIOD:

**Meat:** 7 days,

**Milk:** 4 days,

#### STORAGE:

Store in a cool and dry place.

#### PRESENTATION:

50 x 10 g Sachet

**VETERINARY.  
NOT FOR HUMAN USE.  
FOR ANIMAL TREATMENT ONLY.**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN & PETS, AWAY FROM FOOD.

Carefully read the accompanying instructions before use.

Manufactured by:

**Veko Care Pvt. Ltd.**

Plot No. E - 48 & 49, MIDC, Ranjangaon, District - Pune,

Maharashtra, INDIA. Pin Code : 412220.

Customer care : care@vekocare.com

TM : Trade Mark of Veko Care

**Veko**



VPP1E115

Utilisation réservée aux vétérinaires et cliniques vétérinaires déclarés ou laboratoires ou exploitations agricoles.

## (Poudre Antibiotique Oral de Sulfaguanidine)

# DIARRSTOP™ Poudre orale

### Anti-diarrhéique

#### COMPOSITION:

Chaque 10 g de poudre contient:  
Sulfaguanidine BP .....9 g  
Excipient q.s.p. ....10 g

#### INDICATIONS:

- Traitement d'entérites ou gastroentérites infectieuses provoquées par des germes sensibles à la sulfaguanidine.
- Traitement des coccidioses pour la volaille et le lapin.

#### DOSAGE ET ADMINISTRATION:

Voie orale, en fonction du poids :

Bovin et équidés adultes	30 g à 40 g
Veaux et poulains	8 g à 10 g
Ovins et caprins	4 g à 8 g
Porcins	4 g à 10 g

Administrez une à deux fois par jour et réduire la posologie à partir du 3<sup>ème</sup> jour. Traitez durant 4 à 8 jours.

#### Volaille et lapins :

La sulfaguanidine doit être administrée mélangée à une ration d'aliment sec en proportion de 0,5 à 1%, pendant 3 à 5 jours.

Les animaux doivent être bien abreuvés durant la période de traitement.

#### ESPÈCES CIBLES:

Bovines, Ovins, Caprins, Équidés, Chiens, Chats, Porcins, Volailles et Lapins.

#### DÉLAI DE SEVRAGE:

**Viande :** 10 jours ;

**Lait :** Sans objet

#### CONSERVATION:

À conserver dans un endroit frais et sec

#### PRÉSENTATION:

50 Sachets de 10g

**USAGE VÉTÉRINAIRE  
NE PAS ADMINISTRER À L'HUMAIN.  
EXCLUSIVEMENT POUR LE TRAITEMENT ANIMAL.**

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, TENIR À DISTANCE DES ALIMENTS.

Lire attentivement les instructions jointes avant l'utilisation.

Fabriqué par:

**Veko Care Pvt. Ltd.**

Plot No. E - 48 & 49, MIDC, Ranjangaon, District - Pune,

Maharashtra, INDE. Code Pin : 412220.

Customer care : care@vekocare.com

TM : Trade Mark de Veko Care

**Veko**



VPP1E115